

Produktinformation Diclofenac Orifarm, 11,6 mg/g, gel. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Virkning: Til behandling af lette til moderate lokale smerter i forbindelse med muskelinflammation eller ledsader. **Må ikke anvendes:** Ved overfølsomhed overfor diclofenac eller et eller flere af hjælpestofferne. Ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre eller andre non-steroid antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Ved tidligere symptomer på astma, nældefeber eller snue i forbindelse med brug af acetylsalicylsyre eller andre NSAID. I graviditetens tredje trimester. Må kun anvendes på intakt hud. **Dosering:** Bruges 3-4 gange daglig og gnides forsigtigt ind i huden. Mængden af gel afhænger af det påvirkede områdes størrelse. Den maksimale daglige dosis er 16 g. Bør kun anvendes 7 dage uden aftale med læge. **Bivirkninger:**
Almindelige: Udslæt, eksem, rødme i huden, betændelse på huden, kløe. **Ikke almindelige:** Rødme, blødning under huden, allergisk betændelse, brændende fornemmelse på påføringsstedet. **Sjældne:** Betændelse i huden med blærer. **Meget sjældne:** Udslæt med blærer, overfølsomhed, hævelse af slimhinder i ansigt og luftveje, overfølsomhed overfor lys, nældefeber, tør hud, astma, forsnævring af bronkierne, anafylaktiske reaktioner. **Forsigtighedsregler:** Må ikke indtages oralt. Må ikke komme i kontakt med slimhinder og øjne. Direkte sollys og kunstig belysning bør undgås under behandling og i to uger efter behandling. Den anbefalede behandlingsvarighed bør ikke overskrides. Afbryd behandlingen hvis udslæt forekommer. Må ikke anvendes sammen med lufttætte forbindinger. Indeholder propylenglycol, som kan medføre hudirritation. **Nedsat lever- og/eller nyrefunktion:** Anvendes med forsigtighed. **Graviditet og amning:** Må ikke bruges i tredje trimester af graviditeten. Bør ikke bruges under de første to trimestre af graviditeten uden lægens anvisning. Kan bruges under amning, men må ikke bruges på brystet fra ammende kvinder. **Interaktion med anden medicin:** Samtidig anvendelse af acetylsalicylsyre og andre NSAID kan medføre forøget risiko for bivirkninger. **Børn:** Anbefales ikke til børn under 16 år. **Pakningsstørrelser:** 50 g, 100 g. **Tilskud:** Intet. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Tlf.: 6395 2700. **Pligtteksten er omformuleret i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.**