

**Pligttekst Klarigen<sup>®</sup> (xylometazolinhydrochlorid) 1 mg/ml næsespray, opløsning  
Offentlighed**

**Produktinformation Klarigen<sup>®</sup> (xylometazolinhydrochlorid) 1 mg/ml næsespray, opløsning  
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.**

**Anvendelsesområde:** Korttidsbehandling af tilstoppet næse i forbindelse med almindelig forkølelse og bihulebetændelse. **Dosering:** Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Må ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed over for et af indholdsstofferne. Grøn stær. Tør næseslimhinde. Efter operation i hypofysen eller generelt i hjernen gennem næse eller mund. **Forsigtighedsregler:** Følsomhed over for sympatomimetika (adrenalinlignende lægemidler). Forhøjet blodtryk. Hjerte-karsygdomme. Diabetes. Forhøjet stofskifte. Vandladningsproblemer pga. forstørret prostata. Svulst i binyremarven. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage i træk. Ved ophør af langtidsbehandling kan der forekomme influenzalignende symptomer og hævede slimhinder. Samme næsespray må kun anvendes af en person. Indeholder sorbitol. **Brug af anden medicin:** Forsigtighed ved samtidig anvendelse af visse former for medicin mod depression (Tricykliske og tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere). 2 uger efter anvendelse af MAO-hæmmere. **Graviditet:** Bør ikke anvendes. **Amning:** Bør ikke anvendes. **Bivirkninger:** Almindelige: Sviende eller brændende følelse i næse og svælg, tør næseslimhinde. Sjældne: Systemiske allergiske reaktioner, nervøsitet, søvnløshed, hovedpine, svimmelhed, forbigående synsforstyrrelser, hjertebanken, forhøjet blodtryk, kvalme. **Pakningsstørrelser:** 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml og 5 x 10 ml. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700.