

Offentlighed

Pligttekst Mildin® (Loratadin) 10 mg tabletter
Offentlighed

Produktinformation Mildin® (Loratadin) 10 mg tabletter

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Symptomer ved allergisk snue og kronisk nældefeber. **Dosering:** Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 2-12 år over 30 kg: 1 tablet dagligt. Børn under 30 kg:

Behandling ikke hensigtsmæssig. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed over for et indholdsstof.

Forsigtighedsregler: Alvorligt nedsat leverfunktion. Indeholder lactose. Behandling bør ophøre to dage før priktest. **Brug af anden medicin:** Medicin, der hæmmer leverenzymmer, kan føre til øgede

bivirkninger. Spørg lægen. **Graviditet og amning:** Mildin® bør ikke anvendes. **Bivirkninger:** Børn 2-

12 år: Hovedpine, nervøsitet, træthed. Unge og voksne: Søvnighed, hovedpine, øget appetit,

søvnløshed, allergiske reaktioner, svimmelhed, påvirkninger af hjerterytmen, kvalme, mundtørhed,

mavekatar, unormal leverfunktion, udslæt, hårtab, træthed. **Pakningsstørrelser:** 10, 30 og 100 stk.

Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. **Registreringsindehaver:**

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700. **Udlevering:** HF.

Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk