

## Pligttekst Nicovel (nicotin) 2 mg, 4 mg medicinsk tyggegummi

### Offentlighed

#### Produktinformation Nicovel (nicotin) 2 mg, 4 mg medicinsk tyggegummi

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

**Anvendelsesområde:** Behandling af nicotinafhængighed. **Virkning:** Lindring af nicotintrang og abstinenssymptomer i forbindelse med tobaksafvænning. **Dosering:** 1 stk. tyggegummi hver 1-2 timer. Ved cigaret forbrug under 20 dagligt anbefales 2 mg. 4 mg bør bruges ved stærk nicotinafhængighed, eller hvis rygeophør ikke lykkes efter anvendelse af 2 mg. Max. daglig dosis til rygestop er 24 stk. ved rygereduktion er max. daglig dosis 24 stk. 2 mg eller 12 stk. 4 mg tyggegummi. Kaffe og syrlige drikke bør ikke indtages op til 15 min. før brug af Nicovel. **Må ikke anvendes:** Ved overfølsomhed overfor nicotin eller nogle af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. **Forsigtighedsregler:** Bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed bør udvises ved brug hos patienter med ukontrolleret forhøjet blodtryk, brystsmertter (ustabil eller forværret angina pectoris), alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen, nyligt hjerteanfald eller slagtilfælde, sukkersyge, svulst i binyren (fæocromocytom), overaktiv skjoldbruskkirtel, alvorlig svækket nyre- og /eller leverfunktion samt hos patienter der tidligere har oplevet overfølsomhedsreaktioner med hævelser i læber, ansigt og hals eller kløende udslæt. Bør anvendes ved forsigtighed hos patienter som lider af betændelse i spiserøret eller mavesår idet sunket nicotin kan forværre disse tilstande. Nicotin kan fremkalde afhængighed. Tyggegummi kan klæbe fast til og i sjældne tilfælde beskadige tandproteser og -broer. Indeholder maltitol og sorbitol og bør ikke anvendes ved arvelig fruktoseintolerans. Indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Regelmæssig brug i mere end 6 måneder anbefales ikke. **Brug af anden medicin:** Nicovel kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Det gælder for teofyllin (til behandling af astma), tacrin (mod Alzheimers sygdom), clozapin (mod schizofreni) og ropinirol (til behandling af Parkinsons sygdom). **Graviditet og amning:** Bør ikke anvendes uden lægens anbefaling. **Bivirkninger:** Almindelige: Irritation i mund og hals, smerter i kæbemusklerne, svimmelhed, hovedpine, mave-tarmgener, hikke, kvalme, opkastning. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødme og udslæt. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, uregelmæssig hjerterytme. **Overdosering:** Symptomer der ligner dem, der forekommer ved for megen rygning: Kvalme, sputsekretion, mavesmerter, diarré, svedtendens, hovedpine, svimmelhed, forstyrret hørelse, svaghedsfornemmelse, lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, udmattelse, kredsløbskollaps, krampeanfald.

**Pakningsstørrelser:** 24, 96 og 192 stk. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S, tlf: 63952700. **Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:** [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk).