

Produktinformation Tapin[®] (lidocain og prilocain) 25 mg + 25 mg medicinsk plaster.

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Lokalbedøvelse af huden. **Dosering:** Plasteret påsættes på det udvalgte hudområde.

Voksne, mindre indgreb, f.eks. indstik af kanyler: 1 eller flere plastre mindst 1 time og højst 5 timer før indgreb.

Børn, mindre indgreb, f.eks. indstik af kanyler: 0-2 mdr.: Max 1 plaster i max 1 time før. 3-11 mdr.: Max 2

plastre i max 1 time før. 1 -5 år: 1 eller flere plastre max 1 time før. Max 10 plastre pr behandling. 6-11 år: 1

eller flere plastre max 1 time før. Max 20 plastre pr. behandling. Børn med atopisk dermatit, før afskrabning af

vandvorte: højst 30 min. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed for andre lokalbedøvende lægemidler eller for

indholdsstofferne i Tapin[®]. Spædbørn født før 37. svangerskabsuge. Nedsat nyre- og leverfunktion: Spørg lægen.

Bør ikke anvendes: Til børn 0-12 mdr., som behandles for en blodsygdom. **Forsigtighedsregler:** Sjældent

blodsygdom (glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel eller methæmoglobinæmi). Må ikke anvendes i åbne sår,

undtagen bensår, på skadet hud eller komme i kontakt med øjnene. Spørg lægen inden du bruger Tapin[®] hvis du

har sjældne blodsygdomme, er svækket eller akut syg, er i shock, har atopisk dermatit (eksem), blodforgiftning,

nedsat hjertefunktion, epilepsi, langsom hjerterytme, nedsat mængde blodplasma (hypovolæmi), en neurologisk

lidelse, Wolff-Parkinson-White syndrom (medfødt hjertelidelse), hjertesvigt, svært nedsat nyrefunktion eller en

alvorlig leversygdom. Spørg lægen hvis dit barn er under 12 år, og vejer under 25 kg. Plasteret indeholder

polyoxylet ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner. **Brug af anden medicin:** Spørg lægen inden brug af

Tapin[®] hvis du bruger andre lokalbedøvende midler, medicin mod urinvejsinfektion, halsbrand eller

hjerterytmeforstyrrelser. **Graviditet:** Der bør udvises forsigtighed. Spørg lægen. **Amning:** Udskilles i

modermælk, men hvis dosis ikke overskrides, er der ikke risiko for, at barnet påvirkes. **Bivirkninger:**

Almindelige: Forbigående lokal bleghed, rødmen eller væskeophobninger. **Ikke almindelige:** Brændende,

kløende fornemmelse eller varme på huden, hvor plasteret anbringes. **Sjældne:** Allergiske reaktioner (i de

alvorligste tilfælde anafylaktisk shock). Methæmoglobinæmi (blodsygdom). Irritation af øjet ved tilfældig

øjenkontakt. Læsioner i huden hvor plasteret har siddet. **Pakningsstørrelser:** 2. **Tilskud:** Ingen.

Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700. **Udlevering:** HF.

Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens

hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk