

Lacrofarm Junior (Macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid), pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år. Behandling af meget svær forstoppelse (refraktær obstipation) hos børn fra 5-11 år. **Dosering og indgivelsesmåde:** *Kronisk forstoppelse: Startdosis:* Børn 2-6 år: 1 brev dagligt. Børn 7-11 år: 2 breve dagligt. Dosis reguleres afhængigt af individuelt respons. Maksimal daglig dosis overstiger normalt ikke 4 breve dagligt. Meget svær forstoppelse: Børn 5-11 år: Stigende daglig dosis i 7 dage med henholdsvis 4, 6, 8, 10, 12, 12 og 12 breve dagligt dag 1-7. Hver daglig dosis (opløst i vand) skal indtages over 12 timer. *Administration:* Før anvendelse skal hver poses indhold opløses i ¼ glas vand. *Patienter med nedsat hjertepumpefunktion og patienter med nedsat nyrefunktion:* Behandling af meget svær forstoppelse anbefales ikke. **Må ikke bruges ved:** Overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne. Tilstopet tarm (tarmslyng) eller hul på tarmen. Alvorlige inflammatoriske tarmsygdomme såsom Morbus Crohn og colitis ulcerosa og toksisk megacolon. **Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:** Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Ved symptomer der tyder på ændringer af væske/elektrolytter (salte) skal behandlingen med Lacrofarm Junior stoppes med det samme, og elektrolytterne skal måles. Ved behandling af svær forstoppelse skal patienter med nedsat lukkereflex, halsbrand (forårsaget af, at indholdet i maven løber tilbage til spiserøret) eller mindsket bevidsthed behandles med forsigtighed. **Interaktioner:** Absorptionen og dermed effekten af andre lægemidler kan være nedsat pga. nedsat transittid i tarmen. Macrogol kan øge virkningen af visse lægemidler. Medicin mod epilepsi kan nedsætte effekten af Lacrofarm Junior. **Graviditet og amning:** Lacrofarm Junior kan anvendes under graviditet og amning. **Bivirkninger:** *Almindelige bivirkninger:* Oppustethed, kvalme, mavesmerter, rumlen i maven, luft i tarmene, diaré, opkastning, analt ubehag. *I meget sjældne tilfælde:* Allergiske reaktioner. *Hyppighed ikke kendt:* Elektrolytforstyrrelser, hovedpine, hævelser af hænder/fødder pga væske (perifert ødem). **Pakningsstørrelser:** Æske med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 breve. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S.