

Orilaxal (natriumpicosulfat), orale dråber, opløsning

Læs omhyggeligt oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Anvendelsesområde: Bruges ved forstoppelse af kortere og længere varighed. **Dosering:** Dråberne bør tages om aftenen efter behov. *Voksne:* Begynd med 10 dråber dagligt, dosis kan øges til 20 dråber daglig. Denne dosis bør ikke overskrides. Bør kun anvendes til børn efter aftale med læge. *Børn over 10 år:* Begynd med 10 dråber dagligt, dosis kan øges til 20 dråber daglig. *Børn 4-10 år:* Begynd med 5 dråber dagligt, dosis kan øges til 10 dråber dagligt. *Børn under 4 år:* 1 dråbe pr. 2 kg legemsvægt dagligt. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed over for indholdsstofferne, ingen eller dårlig passage i tarmen, dehydrering, betændelse i tarmen, stærke mavesmerter med kvalme og opkastning (f.eks. blindtarmsbetændelse). **Forsigtighedsregler:** Bør ikke anvendes ved akutte inflammatoriske mave-tarm-sygdomme. Langvarig brug kan medføre forstyrrelser i væske- og saltbalancen. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der er et dagligt behov for brug af afføringsmiddel. Brug over længere perioder bør aftales med læge. For enkelte patienter kan det, at skulle på toilettet, være forbundet med anstrengelse og smerte, hvilket kan være årsag til svimmelhed og besvimelse. **Brug af anden medicin:** Overdrevet brug af Orilaxal sammen med vanddrivende medicin eller binyrebarkhormoner, kan medføre forstyrrelser i saltbalancen. Forstyrrelser i saltbalancen øger bivirkningerne ved brug af digoxin (hjertemedicin). **Graviditet:** Bør kun anvendes efter aftale med læge. **Amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:** *Meget almindelige:* Diarré. *Almindelige:* Mavekramper, mavesmerter, ubehag i maven. *Ikke almindelige:* Svimmelhed, opkastning, kvalme. *Ikke kendt:* Overfølsomhedsreaktioner herunder udslæt (nældefeber) og hævelser, besvimelse, hudreaktioner såsom kløe og udslæt. **Overdosering:** *Symptomer:* Diarré, mavekramper og væsketab. Ved kronisk overforbrug ses kronisk diarré, mavesmerter, nedsættelse af blodets kaliumindhold, som medfører muskeltræthed og nyrepåvirkninger såsom nyresten og nyrebeskadigelse. **Tilskud:** Ej tilskudsberettiget. **Pakningsstørrelser:** 25 ml flaske. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.