

**Pligttekst Lactulose Orifarm (lactulose) 667 mg/ml, oral opløsning
Offentlighed**

Produktinformation Lactulose Orifarm (lactulose) 667 mg/ml oral opløsning

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Tarmregulerende ved kronisk forstoppelse. Forebyggelse og behandling af svær leversygdom (hepatisk og portosystemisk encefalopati). **Dosering:** Forstoppelse: Børn under 5 måneder: 3-6 ml fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 daglig fordelt på 1-2 doser. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger. Voksne og børn over 14 år: Begyndelsesdosis 15-30 ml daglig. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage kan dosis fordobles. Ved leversygdom: Begyndelsesdosis. 30-50 ml 3-4 gange dagligt. Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, idet der tilstræbes 2-3 bløde afføringer i døgnet. **Må ikke anvendes ved:** Blokering af maven eller tarmen, perforation af fordøjelsessystemet. Akutte kirurgiske tilstande i maven (f.eks. blindtarmsbetændelse). Galactoseintolerans. Overfølsomhed over for lactulose eller reststoffer fra fremstillingen f.eks. sulfit. **Forsigtighedsregler:** Årsagen til forstoppelse bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmiddel. Ved symptomer som uforklarligt ondt i maven bør årsagen undersøges før brug af Lactulose Orifarm. Ved længerevarende brug kan saltbalancen i kroppen ændres. Høje doser (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Kan indeholde sulfit fra fremstillingsprocessen. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans, galactoseintolerans f.eks. galactosæmi, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption. **Brug af anden medicin:** Lactulose kan forstærke lavt indhold af kalium i blodet fremkaldt af anden medicin. Lactulose kan forstærke virkningen af hjertemedicin (digoxin). **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:** Meget almindelige: Lette mavesmerter, oppustethed og luft i maven, diarré. Almindelige: Kvalme, opkastning. Ikke almindelige: Ubalance i kroppens saltindhold på grund af diarré. Sjældne: For højt indhold af natrium i blodet (ved behandling af leversygdom). **Pakningsstørrelser:** 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.