

Klaridex (xylometazolinhydrochlorid + dexpanthenol) 1 mg/ml + 50 mg/ml næsespray, opløsning
Offentlighed

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Anvendelsesområde: Kortvarig behandling af tilstoppet næse i forbindelse med forkølelse og til lindring af løbende næse (vasomotorisk rhinitis), understøttende behandling af sårheling på næseslimhinden, behandling af nedsat vejtrækning gennem næsen efter operation i næsen. **Dosering:** *Voksne og unge over 12 år:* 1 pust i hvert næsebor op til 3 gange dagligt efter behov i max 10 dage. **Må ikke anvendes:** Hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne, til børn under 12 år, hvis du har tør betændelse i næseslimhinden med skorpedannelse (rhinitis sicca), efter kirurgisk fjernelse af hypofysen gennem næsen (transsphenoidal hypofysektomi) eller andre operationer hvor vævet der omslutter hjernen (hjernehinden) blotlægges, hvis du har forhøjet tryk i dine øjne, især hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom). **Forsigtighedsregler:** Ved samtidig brug af monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), til behandling af depression og andre lægemidler som kan forhøje blodtrykket, ved alvorlige hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, langt QT-syndrom, svulst i binyren, metabolisk lidelse, f.eks. en overaktiv skjoldbruskkirtel, sukkersyge, forstyrrelse i stofskiftet eller forstørret blærehalskirtel. **Brug af anden medicin:** Spørg lægen inden brug af Klaridex, hvis du tager lægemidler der anvendes til behandling af depression (MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva, f.eks. moclobemid, amitriptylin og doxepin) samt medicin der hæver blodtrykket. **Graviditet:** Bør ikke anvendes under graviditet. **Amning:** Bør ikke anvendes under amning. **Bivirkninger:** *Ikke almindelige:* Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. nældefeber, hævelser, hududslæt, kløe). *Sjældne:* Hjertebanken, hurtig puls, forhøjet blodtryk. *Meget sjældne:* Kramper (især hos børn), rastløs uro, søvnløshed, hallucinationer (især hos børn), træthed (f.eks. døsighed), hovedpine, uregelmæssig puls, øget tilstopning af næsen (ved ophør af behandling), næseblod. *Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:* Brændende fornemmelse og tørhed i næseslimhinden, nysen. **Pakningsstørrelser:** 1 flaske á 10 ml. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.