

Produktinformation Tapin[®] (lidocain og prilocain) 2,5 % + 2,5 % creme.

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Lokalbedøvelse af huden. **Dosering:** Påføres huden under tætsluttende plasterforbinding.

Voksne: 2 g creme på et hudområde der er 2 x 5 cm i mindst 1 og højst 5 timer. **Børn:** 1g creme på et hudområde der er 2 x 5 cm i ca. 1 time eller efter lægens anvisning. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed for andre lokalbedøvende lægemidler eller for indholdsstofferne i cremen. Sjælden blodsygdom (glukose-6-fosfat-dehydrogenase-mangel eller methæmoglobinæmi). Spædbørn født før 37. svangerskabsuge. **Nedsat nyre- og leverfunktion:** Spørg lægen. **Forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes i åbne sår, på skadet hud eller komme i kontakt med øjnene. Bør ikke anvendes på børns kønsslimhinder eller på beskadiget trommehinde. Spørg lægen inden du bruger Tapin[®] hvis du har sjældne blodsygdomme, er svækket eller akut syg, har blodforgiftning, nedsat hjertefunktion, epilepsi, langsom hjerterytme, nedsat mængde blodplasma (hypovolæmi), en neurologisk lidelse, Wolff-Parkinson-White-syndrom (medfødt hjertelidelse), hjertesvigt, hvis dit barn er for tidligt født eller er mellem 0-12 mdr. og behandles for en blodsygdom. **Brug af anden medicin:** Spørg lægen inden brug af Tapin[®] hvis du bruger medicin mod urinvejsinfektion, halsbrand, hjerterytmeforstyrrelser eller andre lokalbedøvende midler. **Graviditet:** Spørg lægen. **Amning:** Udskilles i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides er der ikke risiko for at barnet påvirkes. **Bivirkninger: Almindelige:** Forbigående lokal bleghed, rødmen eller væskeophobninger. Brændende eller kløende fornemmelse på huden, ved anvendelse på kønsslimhinder. **Ikke almindelige:** Brændende eller kløende fornemmelse på huden, hvor cremen påsmøres intakt hud. Føleforstyrrelser som prikken og stikken (ved anvendelse på kønsslimhinder). **Sjældne:** Allergiske reaktioner (i de alvorligste tilfælde anafylaktisk shock). Methæmoglobinæmi (blodsygdom). Irritation af øjet ved tilfældig øjenkontakt. Læsioner i huden hvor cremen har siddet. **Pakningsstørrelser:** 5 g + 2 plastre, 5x5 g tuber med 12 plastre, 30 g tube.

Tilskud: Ingen. **Registreringsindehaver:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700.

Udlevering: HF. **Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på**

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk